

Mittheilungen

über

einen bisher noch wenig bekannten

Blasenwurm.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung des Grades eines

Doctors der Medicin

verfasst und mit Bewilligung

Einer Hochverordneten Medicinischen Facultät der Kaiserl.
Universität zu Dorpat

zur öffentlichen Vertheidigung bestimmt

von

Georg Reinitz
aus Curland.

Ordentliche Opponenten:

Prof. Dr. **M Braun**. — Prof. Dr. **B. Körber**. — Prof. Dr. **L. Stieda**.

Dorpat.

Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei.

1885.

Gedruckt mit Genehmigung der medicinischen Facultät.

Dorpat, den 25. Mai 1885.

Nr. 211.


Decan: Stieda.

Meinem Bruder

gewidmet.

Beim Scheiden von der hiesigen Hochschule ist es mir eine angenehme Pflicht, allen meinen hochverehrten Lehrern für die mir zu Theil gewordene wissenschaftliche Anregung und Belehrung zu danken.

Insbesondere aber bitte ich Herrn Prof. Dr. M. Braun, für die überaus freundliche und linbenswürdige Unterstützung bei der vorliegenden Arbeit meinen aufrichtigsten Dank entgegenzunehmen.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Die Untersuchungen, deren Resultate ich im Nachfolgenden auseinandersetzen werde, sind im Zool. Museum zu Dorpat auf den Rath und unter der Anleitung des Directors desselben, Herrn Prof. Dr. M. Braun ausgeführt worden. Die Arbeit betrifft einen bisher sehr wenig bekannten, der Muskulatur eines Hafen entnommenen Blasenwurm, welcher mir in drei Exemplaren vorliegt, von denen mir eins von Herrn Prof. Dr. Braun, die beiden anderen von Herrn Prof. Semmer in liebenswürdiger Weise zur Verfügung gestellt wurden, wofür ich ihnen meinen Dank ausspreche.

Alle drei Blasenwürmer haben das Eigenthümliche, daß sie polycephal sind, daß ihre der Innenfläche der Mutterblase anhängenden Scoleces eine Anordnung in Längsreihen zeigen und ferner von der Mutterblase nach innen zu sich Tocherblasen entwickelt haben, welche wiederum ihrerseits mit Enkelblasen versehen sind. Ueber das Exemplar, welches ich der Freundlichkeit des Herrn Prof. Dr. M. Braun verdanke, hat derselbe schon früher in einer Sitzung der Dörpater Naturforscher-Gesellschaft kurz berichtet (Conf. die Sitzungsberichte für 1884.)

Bevor ich jedoch an die genauere Beschreibung der in Rede stehenden Thiere gehe, sei es mir erlaubt, die Litteratur, soweit sie auf dieselben Bezug haben könnte, anzuführen.

L i t t e r a t u r.

Von den uns bis jetzt bekannten Blasenwürmern find es zwei: Der Echinococcus und der Coenurus, welche, wie unser Exemplar, sich durch ihre Vielköpfigkeit auszeichnen. Was aber den Echinococcus betrifft, so find seine Köpfchen zu mehreren zusammen in besonderen Brutkapseln (Tochterblasen) eingeschlossen und so klein, daß schon auf den ersten Blick die specifische Verschiedenheit des Echinococcus und des in der Hasenmuskulatur gefundenen Blasenwurms außer Zweifel steht. Anders verhält es sich aber mit dem Coenurus, unter welchem Namen Exemplare beschrieben sind, die vielfach an den von mir beschriebenen Blasenwurm erinnern; namentlich find es solche Fälle, wo diese Finne nicht im centralen Nervensystem, sondern in der Haut, dem Zellgewebe oder der Muskulatur verschiedener Thiere faß und Eigenthümlichkeiten darbot, welche man bei dem eigentlichen Coenurus cerebialis aus dem Hirn der Schafe nicht beobachtet hatte und die uns daher zu einem Vergleich unfres Coenurus mit den oben besagten Fällen auffordern.

Schon im Jahre 1847 hat Gervais einen vielköpfigen Blasenwurm beschrieben ¹⁾, dem er, durch die reihenweise Anordnung der Köpfchen veranlaßt, den Namen Coenurus serialis gab.

1) Mem. de l'Acad. d. Sc. et Lettr. de Montpell 1847. 98 tab. II (mir nur aus der folgenden Arbeit von Baillet bekannt).

Baillet, der vielfach Gelegenheit gehabt hat, diesen Parasiten im Zellulargewebe von Kaninchen und Hasen, wo ihn auch Gervais gefunden hat, zu beobachten, verdanken wir die ausführlichsten Auskünfte über diesen *Coenurus serialis* ¹⁾. Er beschreibt ihn als einen Blasenwurm, welcher sehr dem *Coen. cerebralis* gleicht. Die Blase kann hühnereigroß werden und weist eine große Zahl von *Scolec*es auf, die ab und zu ohne Ordnung durcheinander geworfen erscheinen, am häufigsten jedoch in lineare, einander nicht parallele Reihen angeordnet sind. Die *Scolec*es, welche fast die Größe eines Getreidekorns haben, sind 2—3 mal dicker, als die des *Coenurus cerebralis*. Der Kopf mißt in der Breite $1\frac{1}{2}$ mm., hat einen Rüssel, 4 Saugnäpfe und eine doppelte Krone aus 30 Haken bestehend. Diese nähern sich in ihren Dimensionen sehr denen des *Coenurus Scolex*. Die großen waren 0,14—0,16 mm. lang; die kleinen 0,09—0,12 mm. Was die Blase betrifft, so bietet sie die Eigenthümlichkeit, ab und zu, aber nicht immer, auf dem Wege der Sprossung, sei es auf der inneren oder äußeren Seite, andere, ebenso wie sie organisirte Blasen hervorzubringen, welche auch ihrerseits *Scolec*es produciren können, die in Allem denen der Mutterblase ähnlich sind. Die äußeren Blasen bleiben oft durch eine Art von Stiel an der Mutterblase sitzen, die inneren können sich nach einer gewissen Zeit lösen und bewegen sich dann in der Flüssigkeit, welche die Blase enthält, hin und her. Mit einem solchen Blasenwurme, der, hühnereigroß, am Halbe eines Kaninchens auf der Parotis und Ohrwurzel faß und die eben beschriebenen Charaktere aufzuweisen hatte, hat Baillet 1858 Fütterungsversuche vorgenommen und eine Taenie erzogen, die in vielen Kenn-

1) *Annales des Sciences naturelles*, tome X pag. 227.

zeichen der *Taenia coenurus* sehr nahe kam, ihn aber doch von der Identität beider Thiere nicht überzeugen konnte.

Viel früher noch als Gervais und Baillet, haben nach einer Notiz, die ich R. Moniez *Essai monographique sur les Cysticercos* Lille 1880 pg. 109 entnehme, C. B. Rose 1834 und Leblond 1837 Fälle von polycephalen Blasenwürmern mitgetheilt, die in den Lendenmuskeln und im Rückenmarkskanal des Kaninchens gefunden waren und in ihren Eigenschaften sich von *Coen. cerebralis* unterschieden. Leider sind mir die betreffenden Originalarbeiten nicht zugänglich gewesen und bin ich daher auch nicht in der Lage, Weiteres darüber zu berichten.

Im Jahre 1862 hat Prof Böttcher in Dorpat einen in der Rückenmuskulatur eines Hasen gefundenen Parasiten beschrieben,¹⁾ welcher aus einer ganzen Colonie von Blasenwürmern bestand. Letztere hingen alle mit einander zusammen und zwar so, daß dabei jede Blase für sich abgeschlossen erschien und der ganze Stock ein auffallend traubenähnliches Ansehen darbot, ein Umstand, der Prof. Boettcher veranlaßte, für diesen Blasenwurm die Bezeichnung *Cysticercus botryoides* in Vorschlag zu bringen. Dieser *Cysticercus* war außerdem dadurch ausgezeichnet, daß die Köpfe nicht gruppenweise, wie beim *Coen. cerebralis* standen, sondern jeder Kopf auf einem besonderen mehr oder weniger abge schnürten Blasentheile saß. Indem ich im Uebrigen auf die Arbeit Böttchers verweise, erlaube ich mir hier nur noch einzelne microscopische Data anzuführen, auf die ich noch bei meinen spätern Erörterungen zurückkommen muß. Der

1) Archiv für die Naturkunde Liv-, Est- und Kurlands zweite Serie, Bd III. (pag. 263—372) oder: Mittheilungen über einen bisher noch unbekannten Blasenwurm Dorpat 1862.

Kopf des *Cysticercus botryoides* ist mit 4 Saugnapfen und einem doppelten Hakenkranz versehen, in welchem lange und kurze Haken, in der Gesamtzahl von 28—32, alternierend stehen; das Rostellum misst in der Höhe 0,12 mm in der Breite 0,23—0,26 mm. Der Abstand der Krallenspitze vom Ende des hinteren Wurzelfortsatzes beträgt in den grossen Haken 0,070—0,076 mm; bei den kleinen 0,055—0,057 mm; die Entfernung von der Krallenspitze bis zum Ende des vorderen Wurzelfortsatzes bei den grossen Haken 0,035—0,041 mm, bei den kleinen 0,023—0,026 mm. Die Haken haben in ihrer Gestalt nach Prof. Böttcher am meisten Aehnlichkeit mit denen der *Taenia coenurus*.

Cobbold, dessen Originalarbeiten¹⁾ mir leider auch nicht zugänglich waren, spricht sich, soviel ich aus den betreffenden Referaten (*Journal de l'Anatomie et de la Physiologie*, 1880, pag. 188) erfahre, nicht mit Bestimmtheit darüber aus, ob der von ihm beim americanischen Eichhörnchen gefundene *Coenurus* eine besondere Art sei. Er stimmte insofern mit dem *Coenurus cerebralis* nicht überein, als die Köpfchen nicht gruppenweise, sondern meist in linearen Reihen angeordnet waren und an Grösse die des *Coen. cerebralis* übertrafen. In demselben Werke beschreibt Cobbold einen vielköpfigen Parasiten, den er in der Leber, der Lunge und vereinzelt auch in der Pleurahöhle eines *Lemur macaco* fand. Die Blasen desselben waren traubenartig verbunden und lappig. Die Lappen trugen eine Anzahl öfter in Reihen geordneter *Scolec*.

Ferner hat Lindemann 1867 über einen Blasenwurm berichtet²⁾, den er in der Muskulatur (*m. supraspinatus*)

1) Cobbold. *Parasites* London 1879. pag. 280. *Proceed Linnaean Soc* 1864. Tom VIII. pag. 23.

2) *Архивъ судебной медицины* 1867, декабрь.

eines Hafen fand und welcher dadurch ausgezeichnet war, daß seine 600 Köpfe sehr regelmässig in 6 Doppelreihen angeordnet waren; die zugehörige Abbildung zeigt diese Reihen sehr deutlich, doch ist die Zahl der Köpfchen sehr viel geringer. Die Köpfe hatten 4 Saugnäpfe, ein Rostellum, aber keinen Hakenkranz. Auf Grund dieser Eigenthümlichkeiten glaubte Lindemann berechtigt zu sein, eine neue *Coenurus*art zu unterscheiden und nannte ihn *Coen. Lowtzowi*. Den selben Parasiten will Lindemann gelegentlich einer Section auch im Zwerchfell eines Menschen gefunden haben, der bei seinen Lebzeiten häufig über Koliken und Gastralgie klagte und schliesslich an febris recurrens starb. Bei seinen Fütterungsversuchen, die er an einem Hunde mit den *Scolec* vom Hafen anstellte, glaubte er die *Taenia cucumerina* erzogen zu haben, was sicher auf einem Irrthume beruht, da nach Melnikoff und Leuckart die Jugendzustände der *Taenia cucumerina* in der Hundelaus, dem *Trichodectes canis*, vorkommen.

Einen ähnlichen Blasenwurm hat Perroncito 1874¹⁾ beim Kaninchen und Hafen gefunden und bei den damit angestellten Fütterungsversuchen eine *Taenia* erzogen, die der Baillet'schen gleich war.

Endlich hat Pagenstecher 1877 am Halfe eines Laplatabiebers, *Myopotamus coypus* Geoffroy, eine aus 8 zusammenhängenden Blasen bestehende Geschwulst gefunden und des Näheren beschrieben²⁾. Die grössten dieser Blasen, zwei an der Zahl, waren für sich abgeschlossen und erreichten die Grösse eines Taubeneis; die übrigen sechs waren viel kleiner. Die beiden grossen Blasen waren aus-

1) Annali della R. Accademia d'Agricoltura di Torino vol 17. 1874.

2) Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. XXX. pag. 185.

wendig mit in gefchlängelte Linien angeordneten, 1—1,5 mm. langen Scoleces besetzt. Die Köpfechen maßen etwa 0,58 mm. im Breitendurchmesser und waren mit 4, etwa 0,21 mm. im Durchmesser haltenden Saugnäpfen, einem Rostellum und einem doppelten aus 14—17 Paar Haken bestehenden Kranze versehen. Die Masse von der Spitze bis zum Ende des hinteren Fortsatzes waren für der großen Haken 0,122—0,132 mm, für die kleinen 0,083—0,093 mm. Im Vergleich mit dem *Coenurus cerebralis* fand Pagenstecher, daß die Zahnfortsätze der Haken des von ihm beschriebenen Thieres viel plumper und knolliger und die Wurzelfortsätze der großen Haken viel kürzer waren, als bei jenem. Darauf hin sprach er die Vermuthung aus, daß hier eine besondere *Coenurus*-form vorliegen müsse.

Zum Schlusse möge hier noch der *Coenurus Polytuberculosis* von Megnin¹⁾ Erwähnung finden, welchen der genannte Autor aus der Schenkelmuskulatur einer Springmaus entfernte. Der *Cysticercus*, 3 Ctm lang und 5—10 mm breit, hatte eine unregelmäßig verzweigte Gestalt, welche durch einzelne herzförmige Abschnürungen von der Hauptblase bedingt war. Auf der Innenfläche dieser Abschnürungen, deren Lumen als Fortsetzung des Lumens der Hauptblase angesehen werden konnte, saßen mehrere $\frac{1}{4}$ — $\frac{3}{4}$ mm lange, $\frac{1}{5}$ — $\frac{1}{4}$ mm breite, mit 4 Saugnäpfen und einem doppelten Hakenkranz versehene Scoleces. Die langen Haken betrugen bei 400 facher Vergrößerung 0,07 mm, die kurzen 0,05 mm in der Länge.

Damit glaube ich aus der Litteratur, soweit sie mir zugänglich war, Alles herangezogen zu haben, was vielleicht

1) Sur une nouvelle forme de ver vésiculaire; Journal de l'Anatomie et de la Physiologie 1880 pag 181.

auf den mir zur Beschreibung vorliegenden *Cysticercus polycephalus* Bezug haben könnte. In wie weit letzterer in seinen Eigenschaften den oben angeführten Fällen gleicht, darauf erlaube ich mir, nachdem ich die genauere Beschreibung dieses *Coenurus* vorausgeschickt, noch mit einigen Worten zurückzukommen.

Beschreibung der Blasenwürmer.

Das mir durch die Freundlichkeit des Herrn Prof. Dr. Braun zur Untersuchung und näheren Beschreibung überlassene Präparat stellt einen polycephalen Blasenwurm dar, welcher ausgeschnitten und in Spiritus ausgebreitet etwa die Grösse eines Handtellers repräsentirt. Die Blase besteht aus einer dünnen, mehr oder weniger durchsichtigen Membran, auf deren Innenfläche vier erbsen- bis nussgroße Blasen und eine große Anzahl (196.) kleiner langgestreckter, kolbiger Gebilde sitzen, in welchen die Scoleces des *Cycticercus* nicht zu verkennen sind. Diese Tochterblasen und Scoleces sind in der ganzen Ausdehnung der Membran in vier Längsreihen angeordnet und gewähren mitunter das Ansehen, als ob sie an einem gemeinschaftlichen Faden aufgereiht wären. Wenn auch schon auf den ersten Blick die Reihen in ihrer Anordnung eine gewisse Gleichheit hervortreten lassen, so dürfte es der genaueren Uebersicht wegen doch vielleicht geboten sein, sie noch einzeln einer Betrachtung zu unterwerfen. Ich beginne mit der auf der Abbildung fig. 1. am meisten nach rechts stehenden, etwa acht Ctm. in der Länge messenden Längsreihe, die — wie auch die übrigen Reihen — mehr einer schwachen Kreislinie, als einer geraden entspricht. Bei einer genaueren Befichtigung erweist es sich, daß die Insertionspunkte der Scoleces eigentlich in zwei Linien legen,

die aber so dicht neben einander verlaufen, daß man auf den ersten Blick den Eindruck gewinnt, als ob es sich nur um eine Längsreihe handelte. Die Zählung der Gebilde dieser Reihe ergibt 65 Scoleces und zwei so ziemlich in der Mitte der Reihe placirte bis erbsengroße Tochterblasen. Was zunächst das Verhalten der letzteren anbetrifft, so haben sie wiederum ihrerseits – und zwar die an sich kleinere Blase zehn stecknadelkopfgroße, die größere vier bis Hirsekorn große Enkelblasen aufzuweisen, welche so breit und fest ihren Tochterblasen anliegen, daß sie bei macroscopischer Betrachtung als bloße Ausbuchtungen derselben erscheinen. Während nun die Tochterblasen mit deutlich hervorragenden Köpfchen ausgestattet sind, sieht man an zweien der Enkelblasen durch die mehr oder minder durchsichtige Wand je ein erst im Begriffe der Entwicklung stehendes Köpfchen in Form einer kegelförmigen weisfschattirten Hervorwölbung angedeutet. Die Beweglichkeit der Tochterblasen ist, da sie nur mit einem kleinen Theile ihrer Oberfläche an die Unterlage angeheftet sind, eine ziemlich freie und ergiebige.

Die Scoleces sind, mit sehr wenigen Ausnahmen, alle auf derselben Entwicklungsstufe und zeigen eine Länge von 5–8 mm.; ihr freies Ende ist kolbenförmig angeschwollen, mißt im Durchmesser 1–2 mm und trägt auf dem Scheitel dieser Anschwellung eine trichterförmige Einfenkung. Ihre Anheftung an die Mutterblase geschieht, sozusagen, vermittelt eines Stieles, in welchen der Scolex durch allmähliche Abnahme seines Umfanges ausläuft. Daß diese Scoleces mit ihrer Anheftung durch eine Ausstülpung der Mutterblase entstanden sind, scheint der Umstand zu beweisen, daß es mir gelang, von der Außenfläche der Blase her durch eine Oeffnung, die der Insertion eines Scolex entsprach, mit einem

sehr feinen Stecknadelköpfe bis auf $1\frac{1}{2}$ mm in denselben ohne Mühe einzudringen. Solch eine Communication mit der Außenfläche der Mutterblase habe ich aber nur bei diesem Scolex, der im Verhältnisse zu den anderen einen ziemlich breiten Anheftungsfuß hatte, deutlich sehen können. Die Ausmündungen der übrigen waren mit bloßem Auge nur am frischen Präparat deutlich wahrzunehmen. Alle Scoleces aber hatten gemäß ihrer fußartigen Anheftung eine sehr ausgiebige Beweglichkeit aufzuweisen.

Die zweite nächstfolgende, etwa 7 Ctm lange Reihe unterscheidet sich von der ersten dadurch, daß sie in der Mitte durch einen von Scoleces freien Platz unterbrochen wird, an welchem die Blasenwand zahlreiche, wohl durch die Alcoholeinwirkung veranlaßte Faltungen zeigt. Die Insertion der Scoleces, deren man 45 zählt, geschieht hier weniger in zwei neben einander verlaufenden Längslinien, als vielmehr in einzelnen, aus drei bis fünf Individuen bestehenden Gruppen, die in ihrer Gesamtheit eine Längsreihe bilden. Die Anheftung und die Beweglichkeit, die Form und Länge der Scoleces zeigt nichts davon Abweichendes, was über die der ersten Reihe gesagt ist.

Die zwei dieser Reihe angehörenden, etwa aufsgroßen Tochterblasen sind vermittelt eines gemeinschaftlichen Stieles der Mutterblase angeheftet und zeigen eine ausgiebige Beweglichkeit. Die eine dieser Blasen ist außerdem dadurch ausgezeichnet, daß sie 4, etwa 4 mm. lange Scoleces trägt, welche sich in nichts von denen der Mutterblase unterscheiden. Abgesehen von diesen deutlich hervorragenden Gebilden, von denen zwei dicht bei einander, die beiden anderen aber getrennt an verschiedenen Stellen der Blase sitzen, bemerkt man noch an der letzteren zwei kleine weißliche Hervorbuchtungen, augenscheinlich auch von

Köpfchen herrührend, die entweder im Begriffe sind an die Außenwand hervorzubrechen, oder nach dem Innenraum hinein sich entwickelt haben. Im Gegensatze dazu hat die nebenan stehende Blase keine Scoleces aufzuweisen, ist aber dafür mit drei, etwa hirsekorngroßen Enkelblasen ausgestattet, welche an dem mit dem Anheftungstiele versehenen Pole der Blase ihren Platz gefunden haben.

Ehe ich nun an die dritte Reihe gehe, will ich nicht unerwähnt lassen, daß in dem Zwischenraume zwischen den ersten zwei Reihen noch Scoleces sitzen, die, wie man sich davon auf der Abbildung überzeugen kann, weder zur Reihe I, noch II gezählt werden können, sondern eine gesonderte Stellung einnehmen und zwar so, daß sechs davon in einer besonderen Gruppe zusammenstehen und einer für sich dasteht.

Was uns bei der dritten Reihe besonders auffällt, ist, daß hier die Scoleces gleichsam wie an einem Faden aufgereiht sind; ja man sieht sogar auch einen fadenförmigen Strang, der, mit seiner Unterlage fest verschmolzen, auf einer großen Strecke die Infertionspunkte einzelner Scoleces verbindet. Die Anordnung der letzteren in einer Doppelreihe ist hier, wenn auch an einzelnen Strecken angedeutet, so doch im Ganzen sehr wenig deutlich ausgesprochen; im Uebrigen aber finden wir bei ihnen dieselben Verhältnisse, wie bei den Scoleces anderer Reihen. Die ganze, etwa 6 Ctm. lange Reihe zählt 46 Individuen, hat aber keine Tochterblasen aufzuweisen.

Die vierte und letzte Reihe endlich trägt bei einer Länge von 5–6 Ctm. die Zahl von 33 Scoleces, die in Form und Größe, Anheftungsmodus und Beweglichkeit mit den anderen übereinstimmen. Auch hier findet man keine Tochterblasen.

Im Anschlusse hieran gebe ich noch die macroscopische Beschreibung der beiden anderen Exemplare des Blasenwurms, welche ich der Freundlichkeit des Hr. Prof. Semmer verdanke. Letzterer hatte sie bei Gelegenheit einer Section in der Schenkelmuskulatur eines Hasen gefunden und das Präparat in toto in Spiritus aufgehoben.

Tief in der Substanz der Muskulatur, die stark auseinandergedrängt ist, begraben, von einer dickwandigen, eine Cyste bildenden bindegewebigen Membran umhüllt, liegen dicht auf einander zwei Blasen, von denen die oberflächlichere an einer Seite aufgeschnitten und durch den theilweisen Verlust ihres Inhalts collabirt ist, während die darunter liegende, an allen ihren Theilen intact, im Großen und Ganzen ihre frühere Gestalt beibehalten zu haben scheint. Die Lagerung dieser Blasen ist eine derartige, daß sie mit ihrem Längendurchmesser dem Verlaufe der Muskelfasern folgen. Ihre an sich glatte Oberfläche zeigt Faltungen, die offenbar durch die Einwirkung des Alcohols entstanden sind.

Wiewohl nun beide Blasen als Jugendzustände eines und desselben Thieres dieselben Eigenthümlichkeiten darbieten, so glaube ich doch die gesonderte Beschreibung beider mir umfoweniger ersparen zu dürfen, als wegen der bisher noch sehr mangelhaften Kenntnisse über das Vorkommen dieser Gebilde neben dem Wesentlichen auch das Nebensächliche erwähnt zu werden verdient, was bei einem summarischen Urtheil mitunter nicht ohne Beeinträchtigung der Uebersichtlichkeit geschehen kann. Demnach will ich auch jede Blase einzeln der Betrachtung würdigen und gebe zunächst die Beschreibung der ersten, nämlich der, welche in dem Praeparate oberflächlicher lag und die andere gleichsam zudeckte.

Diese Blase stellt, vollständig aufgeschnitten und in

Spiritus ausgebreitet, ungefähr die Grösse eines halben Handtellers dar. An ihrer Innenfläche sieht man eine große Menge von Scoleces, welche in ihrer Anordnung in sofern eine Regelmäßigkeit an den Tag legen, als sie der Hauptfläche nach in sechs Doppellängsreihen placirt sind. Freilich sind diese Reihen nicht so schön ausgebildet, wie bei dem vorhin beschriebenen Exemplare, sondern es zeigt jede von ihnen hier und da durch von Scoleces entblößte Partien Unterbrechungen ihres Zusammenhanges und leichte Verschiebungen der unterbrochenen Enden gegen einander. Außerdem macht man nicht selten die Beobachtung, daß die Scoleces in den Längsreihen wiederum zu Gruppen aus 3 oder 4 Individuen bestehend beisammen sitzen. Wenn ich hier die Maasse von den Reihen folgen lasse, so haben sie nur insofern einen Werth, als man auch die Unterbrechungen der letztern in Berücksichtigung zieht. Die erste Reihe, welche keine nennenswerthe Unterbrechung zeigt, mißt $5\frac{1}{2}$ Ctm. in der Länge und zählt 31 Scoleces. Die zweite mit einer zweimaligen Unterbrechung von etwa 8 mm zählt 34 Individuen und mißt 6 Ctm. in der Länge. Auch die dritte ist zweimal, jedes mal mit etwa $\frac{1}{2}$ Ctm. in ihrer Continuität unterbrochen, zählt 60 Scoleces und hat eine Länge von 5 Ctm. Die 4^{te} 30 Scoleces tragende Reihe zeigt keine nennenswerthe Unterbrechung und mißt 4 Ctm. in der Länge. Ebenio ist die 5. Reihe fast garnicht unterbrochen, hat 33 Scoleces und mißt 5 Ctm. Die 16 Scoleces der 6. Reihe endlich sind mehr in Gruppen, als in einer Reihe angeordnet und gestatten nicht gut eine Maassbestimmung.

Somit besitzt die Blase im Ganzen 204 Scoleces, die stark geschrumpft und von ovaler Gestalt sind. Ihr Längendurchmesser beträgt 3 mm. ihr Breitendurchmesser durchschnitt-

lich 2 mm und haben sie auf ihrem leicht angeschwollenen Scheitel eine trichterförmige Depression. Ihre Beweglichkeit ist, da sie durch die Schrumpfung der Mutterblase stark angezogen sind, eine sehr geringe; ihr Stiel garnicht, oder erst wenn man die Köpfchen etwas nach oben zerzt, wahrzunehmen. Neben den Scoleces nun haben wir noch andere Gebilde, die unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Es sind das drei, etwa erbsengroße Tochterblasen, von denen zwei in einer und die dritte in einer anderen Reihe der Scoleces ihren Platz haben. Die beiden ersteren hängen mit einander zusammen und sind vermittelt eines etwa 3—5 mm langen Stieles an die Mutterblase angeheftet; die dritte sitzt etwas breiter mit einem Theil ihrer Peripherie der Unterlage auf. Alle drei aber sind sie durch Köpfchen ausgezeichnet, die offenbar noch in der Entwicklung begriffen sind und in Form weißer, kaum stecknadelgroßer Knötchen die Blasewand hervorbuchten.

Die zweite in ihrer Wandung intacte Blase fühlt sich beim Druck fest und knollig an. Beim Aufschneiden derselben fand ich sie zum Theil mit Köpfchen und Blasen, zum Theil mit einer grützartigen Masse gefüllt, die ein ziemlich festes Gerinnsel darstellte. Die microscopische Untersuchung ergab, daß diese Masse geronnenes Eiweiß und eine Anzahl von Fettkry stallen enthielt, welche sich als isolirte feinste Nadelchen, theils als vielstrahlige stechapfelförmige Bündel darstellten. Mitunter fand man auch solche, welche in Form großer farbloser rhombischer Tafeln erschienen, eine Form, die, wie wir wissen, den Cholestearinkry stallen eigen ist. Nach Kalkkörperchen, Trümmern von Cuticularhäuten und Scoleces, die kein seltenes Vorkommniß im Inhalte solcher Blasen abgeben, habe ich gesucht, aber nichts davon wahrnehmen können. Den Hauptantheil aber

an der Ausfüllung dieser im ausgebreiteten Zustande vollständig die Hälfte der Gröfse eines Handtellers repräsentirenden Blase boten immer die Scoleces und Tochterblasen dar, die in einer recht ergiebigen Zahl vertreten waren. Die Scoleces anbelangend, so sind sie auch hier in Längsreihen angeordnet, die hier und da in ihrer Richtung verschoben und durch köpfchenfreie Stellen in ihrem Zusammenhange unterbrochen sind. Dagegen findet man eine Anheftung der Scoleces in dicht neben einander stehenden Linien nur an sehr wenigen Stellen deutlich ausgesprochen, während Gruppen aus 3—4 Individuen bestehend sehr häufig in den Reihen anzutreffen sind. Wie bei dem vorigen Exemplare, so lassen sich auch hier sechs Reihen unterscheiden mit folgenden Maafsen und nachstehender Zahl der Scoleces.

1. Reihe 4 Ctm lang, ist in ihrem Zusammenhange nicht unterbrochen; Zahl der Scoleces 38.

2. Reihe 3 Ctm lang; ohne Unterbrechung des Zusammenhanges; Zahl der Scoleces 36.

3. Reihe 4 Ctm lang; keine nennenswerthe Unterbrechung; Zahl der Scoleces 29.

4. Reihe $2\frac{1}{2}$ Ctm lang; ohne Unterbrechung; Zahl der Scoleces 27. In der Mitte der Reihe eine geschrumpfte, etwa erbsengrofse Tochterblase, stielartig angeheftet.

5. Reihe $5\frac{1}{2}$ Ctm lang; Zahl der Scoleces 61. In der Mitte eine leere Stelle, in der Nähe derselben 5 Tochterblasen mit einem bandförmigen Stiel der Mutterblase angeheftet. Drei andere stehen mit den ersten 5 durch feine Fäden in Verbindung und eine liegt [ohne Anheftung frei neben diesen.

6. Reihe $3\frac{1}{2}$ Ctm lang; zeigt einzelne Unterbrechungen; Zahl der Individuen 39.

Die Blase hat also im Ganzen 230 Scoleces, welche im Wesentlichen dasselbe Verhalten zeigen, wie die der beiden anderen Exemplare. Wir haben es auch hier mit kleinen, an ihrem freien Ende kolbenförmig angeschwollenen Gebilden zu thun, die bei einer Länge von 2–4 mm. im Dickendurchmesser etwa 2 mm. betragen und auf ihrem Scheitel eine kleine, trichterförmige Depression tragen. Was aber diesen Blasenwurm vor den beiden anderen Exemplaren auszeichnet, das ist die verhältnissmässig grosse Menge von Tochterblasen, die wir in seinem Innern vorfinden. Wir zählen ihrer 9 an der Zahl, wovon aber nur eine einzige wiederum eine Enkelblase aufzuweisen hat. Letztere und drei der Tochterblasen sind ihres Inhaltes verluftig gegangen und bedeutend geschrumpft, so dass man ihre Gestalt und Grösse schwer angeben kann. Die anderen sechs haben sich gut erhalten, gleichen in ihrer Gestalt einem Ovoid und sind etwa nussgrös. Mit einer einzigen Ausnahme tragen alle diese Tochterblasen Köpfchen, theils solche, die schon deutlich, etwa 2–3 mm. hervorragen, theils solche, die noch in der Blasenwandung stecken. Diese Köpfchen, die zu einem oder zu zweien an einer Blase vorkommen, haben ihren Sitz meist an einem Pole derselben, eine Eigenthümlichkeit, wie wir sie bei den Tochterblasen der beiden anderen Exemplare nicht beobachtet haben. Morphologisch scheinen sie blosse Theilstücke der Blase zu sein, indem sie sich durch allmähliche Ausstülpung derselben entwickeln. Als Beweis hierfür führe ich den Umstand an, dass es möglich ist, von der Innenfläche einer Tochterblase aus mit einem sehr feinen Stecknadelkopfe mitunter bis auf 2 mm. in einen solchen Scolex hineinzugehen und seine Communication mit dem Lumen der Blase nachzuweisen. Den Inhalt der Tochterblasen bilden, wie es sich bei der microscopischen Unter

fuchung erwies, dieselben detritusähnlichen Massen, die wir schon bei der Mutterblase kennen gelernt haben.

Wenn wir nun das, was wir im Vorhergehenden über die drei Blasenwürmer gesagt, nochmals durchmustern, so können wir uns nicht der Ansicht verschließen, daß es sich hier um Jugendzustände eines und deselben Parasiten handelt. Den Sitz in der Musculatur von Thieren derselben Art; die Anordnung der Scoleces in Längsreihen; die Eigenthümlichkeit der Mutterblase ins Innere hinein Tochterblasen zu produciren, die mit denselben Fähigkeiten ausgestattet sind, wie sie, nämlich wiederum Blasen und Scoleces hervorzubringen, haben alle drei Exemplare mit einander gemein. Daß die Scoleces des einen Blasenwurms verhältnißmäßig viel länger sind, als die der beiden andern, erklärt sich theils aus der bedeutenderen Entwicklung und GröÙe der Mutterblase des ersten, theils aus der Schrumpfung der letzteren, welche sie dadurch erlitten haben, daß, nachdem sie der Muskulatur entnommen, sie sofort in Alcohol gebracht worden sind. Weiterhin aber befähigt uns die Erwägung der macroscopischen Daten zu dem vorläufigen Auspruche, daß es sich hier um einen Blasenwurm handelt, dessen systematische Hingehörigkeit noch schwankt und dessen Eigenthümlichkeiten und genauere Beschaffenheit noch nicht genügend erforscht sind. So wird es denn auch nicht überflüssig sein, wenn ich die macroscopische Beschreibung durch die bei der microscopischen Betrachtung gewonnenen Notizen ergänze.

Die Kopfbildung als wichtigstes Kriterium zur Unterscheidung der verschiedenen Taenienarten nimmt in erster Linie unsere Aufmerksamkeit in Anspruch. Der Kopf mit seinen vier seitlich stark vorragenden, muskulösen Saugnäpfen hat von oben gesehen eine unregelmäßig viereckige Gestalt und bietet bei 75 facher Vergrößerung ein Aussehen, wie es

auf Fig. 2 der Abbildung versinnbildlicht ist. Sein größter Durchmesser, der in die Ebene der Saugnäpfe fällt, beträgt mit einem Microscop von Seibert, Ocular III, Obj. V, nach gegebenem Micrometerwerth gemessen 0,641. Seine Höhe vom Scheitel bis zur Ebene unterhalb der Saugnäpfe 0,614; bis zur ersten Faltung links, wo sie früher beginnt, als auf der rechten Seite 0,932. Die muskulösen, rundlich erscheinenden Saugnäpfe, an welchen die in eine helle Binde substanz eingelagerten Radiär- und Ringsfasern deutlich zu unterscheiden sind, haben einen Durchmesser von 0,233 mm. Die Dicke der Radiärmuskeln beträgt 0,058, die Oeffnung der Saugnäpfe 0,145. Die genauere histologische Structur ist aus dem das Köpfchen in toto darstellenden Präparate natürlich nicht herauszulesen. Dagegen bemerkt man kleinere und größere Concretionen von scheibenförmiger oder sphäroidaler Gestalt, in welchen die auch bei anderen Taenienarten vorkommenden Kalkkörperchen nicht zu erkennen sind, durch das ganze Körperparenchym zerstreut. Manche von ihnen präsentiren sich als schwarze, scharf gegen ihre Umgebung abgegränzte Gebilde, ein Aussehen, welches sie der in sie eingedrungenen Luft verdanken.

Das Rostellum ist linsenförmig hervorgestülpt und hebt sich, wie die Fig. 2 zeigt, von dem übrigen Körper jeder seits durch einen Einschnitt deutlich ab. Es ist 0,116 mm. hoch und mit einem doppelten Hakenkranz versehen, in welchem lange und kurze Haken alternirend stehen. Nach einer an verschiedenen Individuen vorgenommenen Zählung beträgt die Gesamtzahl der Haken 26–28. Sie weichen in ihrer Gestaltung stark von den bisher bekannten Formen ab und könnten am ehesten noch mit denen des *Coenurus cerebralis*, Fig. 6, verwechselt werden. Beim genaueren Zusehen aber ergeben sich auch hier, wie man das an den

Abbildungen, Fig. 5 und 6, verfolgen kann, deutliche Differenzen. Zur Bestimmung und Vergleichung der Gröfsenverhältnisse sind von mir Messungen an verschiedenen Exemplaren vorgenommen worden und ich lasse die Zahlen in der tabellarischen Zusammenstellung folgen. Vorausschicken will ich nur noch, daß *ac* (Fig. 5) die Entfernung zwischen der Krallenspitze und dem Ende des hinteren Wurzelfortsatzes bedeutet; *ae* die Entfernung zwischen der Krallenspitze und dem Ende des vorderen Wurzelfortsatzes; *ab* die Entfernung von der Krallenspitze bis zum Zusammenstoß des vorderen Wurzelfortsatzes mit der Kralle; *ad* den Breitendurchmesser des Hakens in der Gegend des vorderen Wurzelfortsatzes.

Große Haken vom *Coenurus* des Hafens, fig. 5. Seibert,

Ocul. III. Obj. V.

<i>ac</i>	0,143	0,139	0,146	0,139	0,139 mm.
<i>ae</i>	0,069	0,063	0,069	0,069	0,063 „
<i>ec</i>	0,088	0,076	0,076	0,076	0,076 „
<i>ed</i>	0,050	0,044	0,050	0,050	0,050 „
<i>ab</i>	0,059	0,050	0,063	0,059	0,059 „

Kleine Haken vom *Coenurus* des Hafens.

<i>ac</i>	0,107	0,101	0,107	0,101	0,101 mm.
<i>ae</i>	0,057	0,044	0,057	0,050	0,057 „
<i>ec</i>	0,058	0,050	0,059	0,057	0,057 „
<i>ed</i>	0,044	0,044	0,041	0,044	0,041 „
<i>ab</i>	0,048	0,041	0,044	0,041	0,044 „

Große Haken vom *Coen. cerebialis*, Fig. 6.

<i>ac</i>	0,152	0,152	0,155	0,152	0,155 mm.
<i>ae</i>	0,076	0,077	0,076	0,076	0,076 „

ec	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076 mm.
ed	0,050	0,044	0,050	0,050	0,050 „
ab	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063 „

Kleine Haken vom Coen. cerebral.

ac	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114 mm.
ae	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057 „
ec	0,057	0,050	0,050	0,057	0,058 „
ed	0,044	0,038	0,044	0,038	0,038 „
ab	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050 „

Aus den Abbildungen fig. 5 und fig. 6 und der tabellarischen Zusammenstellung erhellt nun, daß erstens die Haken unseres Coenurus deutlich in zwei Kategorien: kleine und große Haken zerfallen und daß sie zweitens deutliche Unterschiede von denen des Coen. cerebr. aufzuweisen haben. Wenn die Größendifferenz beider auch nicht so sehr bedeutend ist, so geht daraus doch soviel mit Sicherheit hervor, daß die Haken unfres Coenurus von denen des Coen. cereb. an Größe übertroffen werden, ein Umstand, der mit Berücksichtigung der Größenverhältnisse der Scoleces beider Thiere seine Erklärung nicht etwa in der mehr oder minder vorgeschrittenen Entwicklung dieser Gebilde finden dürfte. Viel eclatanter aber noch, als in der Größe sehen wir in der Gestaltung der Haken einen Unterschied hervortreten. Während nämlich der Dornfortsatz der Haken des Coen. cereb. im Ganzen plump und knollig nach unten zum hinteren Wurzelfortsatze hingelichtet ist, sieht er bei dem Coenurus vom Hafen mehr nach oben zur Krallenspitze hin und ist in seiner Gestaltung viel schlankere und schlanker. Solches finden wir namentlich an den großen Haken ausgesprochen, während die kleinen auch wohl meist, aber nicht durchgehend diesen Unterschied aufzuweisen haben.

Wenn nun schon das eben Angeführte geeignet ist, in uns die Meinung von der Verschiedenheit beider Coenuri hervorzurufen, so werden wir vollends davon durch zwei andere Merkmale überzeugt. Letztere sind: erstens die eigenthümlich herzförmige Bildung des Dornfortsatzes der großen Hacken des Coenurus cerebralis, eine Eigenthümlichkeit, die bei unserm Coenurus nicht vorkommt und zweitens die verschiedene Configuration der kleinen Haken beider Arten. Die kleinen Haken unfres Coenurus sehen nämlich im Verhältniß zu denen des Coenurus cerebralis gedrungener und plumper aus, ihre Krallen sind weniger gekrümmt und an der Basis dicker. Hervorgehoben zu werden verdient auch noch, daß der vordere Wurzelfortsatz der letzteren sehr häufig eine Spaltung trägt.

Was nun die histologische Beschaffenheit des Kopfes betrifft, namentlich aber des Rostellums, das bei der Beurtheilung der Arten einen der wichtigsten Factore abgiebt, so werden wir hier vielfach Verhältnisse vorfinden, die damit übereinstimmen, was uns schon früher von Leuckart,¹⁾ Nitsche²⁾ und Steudener³⁾ über den Bau des Rostellums der anderen großen Taenien mitgetheilt worden ist. Die Untersuchungen, die ich darüber an unfrem Coenurus angestellt habe, wurden an Längsschnitten vorgenommen, die von in absolutem Alcohol gehärteten und in toto in Alauncarmin gefärbten Exemplaren angefertigt wurden. Das Schneiden geschah, nachdem die Praeparate in einer Mischung von Paraffin und Rindstalg eingebettet waren, mit dem Thomafchen Microtom; es wurden zur Untersuchung Schnitte

1) Leuckart, Blasenbandwürmer pag. 63.

2) Nitsche, Zeitschrift für wissensch. Zoologie Bd. XXIII p. 181.

3) Steudener: Unters. über den feineren Bau der Cestoden. Halle 1877.

von $\frac{1}{65}$ mm. Dicke gewählt, sowohl von Köpfchen mit zurückgezogenem, als auch mit vorgestülptem Rostellum. Dafs das Hervorstülpen und Zurückziehen des Rostellums blofs von der Thätigkeit der muskulösen Elemente des Köpfchens abhängig ist, bleibt eine Thatfache, die weiter keiner Begründung bedarf und es leuchtet auf den ersten Blick ein, dafs, während das Hervorstülpen eine gewisse Thätigkeit der Muskulatur voraussetzt, letztere beim zurückgezogenen Rostellum im erschlafften, also im Ruhezustande sich befindet. Ich lasse hier nun zunächst die Beschreibung des Rostellums folgen, wie es im Ruhezustande der Muskulatur sich präsentirt.

Was uns hier zunächst auffällt, ist der Umstand, dafs der Hakenkranz tief mit seiner Unterlage eingesunken ist, so das er in einer Ebene mit den Saugnapfen zu stehen kommt. Von den Wurzelfortfätzen, welche in die aus einer vielfach verfilzten Binde substanz und den darin eingelagerten ovalen Kernen bestehenden Subcuticularschicht eingebettet sind, steht der grosse hintere fast vertical, während der kleine vordere sich mehr der horizontalen Lage nähert. Dem entsprechend ist die Krallenspitze nach oben gerichtet, ragt aber nicht frei über den Scheitel hervor, sondern ist von einer im Wesentlichen aus der Cuticula und Subcuticula bestehenden Ringfalte vollständig überdacht. Durch die sich erhebende Ringfalte einerseits und andererseits durch die Einfenkung, welche der Hakenkranz mit seiner Unterlage erlitten hat, kommt am Scheitel eine trichterförmige Depression zu Stande. Die Einfenkung aber können wir uns nur durch die Erschlaffung der Muskulatur und durch die dadurch bedingte Gestaltveränderung des gleich zu beschreibenden Kiffens erklären. Dieses Kiffen nun hat beim retrahirten Rostellum eine concavconvexe

Gestalt und ist so gelagert, daß die convexe Fläche nach innen, die concave nach außen sieht und unmittelbar den Wurzelfortfätzen der Haken anliegt, so daß diese gleichsam auf dem Rostellum reiten. Gehen wir auf die feinere Structur des Kiffens ein, so haben wir unter einer scharf gezeichneten, structurlosen Außenschicht ein feinverfilztes Gewebe vor uns, welches in der Anordnung seines Faserverlaufes einen zwar complicirten, aber doch durch eine gewisse Gesetzmäßigkeit geregelten Anblick darbietet. Wir können nämlich hier der Hauptsache nach zwei deutliche Systeme von Fasern unterscheiden, von denen das eine mehr der Längs-, das andere mehr der Queraxe des Köpfchens entspricht; das erste gehört dem oberen und unteren Theile des Kiffens an, das zweite ist nur auf den unteren Theil beschränkt. Die Fasern des oberen Systems sind am dichtesten in der Mitte des Kiffens, was daher rührt, daß sie hier von allen Seiten gleichsam zusammenlaufen; es haben aber auch die der Mitte des Kiffens entsprechenden Fasern einen fast vollständig verticalen Verlauf, während die den Seitentheilen angehörenden mehr zur Queraxe geneigt sind und in geschwungenen Linien zur Mitte hinstreben. Zwischen den Fasern dieser Schicht sieht man Kerne in ziemlich ausgiebiger Menge eingelagert. Eine besondere Anhäufung der Kerne an einem Punkte, beispielsweise in der Mitte der unteren Fläche des Kiffens, wo sie Nitsche bei der *Taenia crassicollis* in großer Menge fand, habe ich nicht beobachten können.

Was das zweite der unteren Fläche des Kiffens angehörende Fasersystem betrifft, so verläuft es, von der Mitte der unteren Fläche des Kiffens beginnend und dieses gleichsam von unten umgreifend, in die Richtung der Queraxe nach beiden Seiten hin, um an den Seitenrand des Bulbus

zu treten und in der Gegend der vorderen Wurzelfortsätze zu enden. Die Fasern verlaufen aber weniger in einer geraden, als in einer wellenförmigen Linie und sind von den Fasern des ersten Systems gekreuzt, was ich namentlich in der Mitte der unteren Fläche des Kiffens an der netzförmigen Zeichnung deutlich sehen konnte. Die Massenhaftigkeit, in welcher die Fasern des zweiten Systems vertreten sind, steht hinter der des ersten bedeutend zurück. Dagegen sind sie viel enger an einander gedrängt, ja so dicht neben einander stehend, daß man wohl das Bündel in toto, viel weniger aber die einzelnen dasselbe zusammensetzenden Fasern unterscheiden kann. Unter Anwendug von Seibert Ocular III. Obj. V gemessen, beträgt das Bündel 0,012 mm im Dickendurchmesser, während das erste System etwa 0,044 mm ergibt.

Außer diesen zwei schon auf den ersten Blick deutlich in die Augen springenden Faser-systemen, welche nach Leuckart muskulöser, nach Nitsche aber elastischer Natur sind, finden wir beim genaueren Hinschauen unterhalb der nach der Queraxe verlaufenden Fasern noch eine dritte kleine Gruppe von Muskelbündeln, welche auf dem Querschnitte getroffen sind und sich als helle rundliche Körner präsentiren. Am deutlichsten sind sie an den beiden äußeren Dritttheilen der unteren Fläche des Kiffens vertreten und reichen von da bis zu den vorderen Wurzelfortätzen hinauf.

Fassen wir endlich behufs Feststellung einzelner Maasse noch das ganze Kiffen, wie es uns beim zurückgezogenen Rüssel entgegentritt, ins Auge, so hat es an verschiedenen Stellen eine verschiedene Höhe; sein größter Höhendurchmesser beträgt 0,063, sein Breitendurchmesser 0,190 mm. Dieses Kiffen nun wird von einer muskulösen Lage getragen, die sich eng an dasselbe anschließend dieselbe concavconvexe

Gestaltung zeigt und aus einer großen Anzahl übereinandergethürmter Muskelschalen aufgebaut ist. Die Muskelschalen aber stoßen nicht eng an einander, sondern sind durch eine mehr oder weniger deutliche Schicht von Körnern (quergetroffene Fasern) getrennt und in der Nähe des Kiffens deutlich gegen einander abgegränzt und leicht zählbar; je mehr aber sie sich von demselben entfernen, desto schwächer werden die Lagen, desto verwaschener ihre Conturen und schließlich gehen sie, ohne daß man eine Grenze angeben könnte, allmählig in die Muskulatur des Körperparenchyms über. Dieser Umstand ist es auch, welcher den Bau des Köpfchens unsres *Coenurus* anders erscheinen läßt, als den der *Taenia crassicollis*, bei der die Gesamtheit der Muskelschalen ein für sich scharf abgegrenztes Gebilde darstellt. Auch das Auslaufen der muskulösen Schalen zur Seite hin in einen scharfen Rand, welcher bei der *Taenia crassicollis* nach Nitsche fennenartig an den kleinen Wurzelfortatz herantritt, ist bei unserem *Coenurus* nicht in diesem Maasse ausgesprochen; es endigen hier vielmehr die Muskelfasern ohne eine derartige scharfe Begrenzung theils in der Gegend des vorderen Wurzelfortatzes, theils strahlen sie, die letzteren überragend, zusammen mit den Endigungen der innern Längsmuskulatur des Körperparenchyms in die Subcuticula hinein. Hinsichtlich des Faserverlaufes aber in den einzelnen Schalen besteht hier die gleiche complicirte Anordnung von sich kreuzenden und verflechtenden Muskelbündeln, wie sie bei der *Taenia crassicollis* von Nitsche beschrieben ist; nur finden wir hier noch zwischen die einzelnen die Schalen zusammensetzenden Bündel mitunter reichlich Kerne eingestreut, welche mit ihrer Längsaxe meist dem Faserverlaufe folgen.

Es erübrigt nur noch, zweier Gebilde Erwähnung zu thun, welche bei der Systematisirung der Taenien von Be-

deutung sind: nämlich der Saugnäpfe und der Gefäße. Betreffs ersterer können wir darauf verweisen, was wir Eingangs der mikroskopischen Beschreibung über dieselben gesagt; über die letzteren aber vermag ich nach den mir vorliegenden Präparaten nur soviel mitzuthellen, daß ich sie vielfach verästelt in der Gegend der Saugnäpfe gefunden habe.

Nachdem wir nun im Vorhergehenden die histologischen Structurverhältnisse des Köpfchens beim zurückgezogenen Rostellum genauer kennen gelernt, werden wir bei Betrachtung des Köpfchens mit vorgefühltem Rostellum nichts Neues hinzuzufügen haben und unser Augenmerk lediglich der Gestaltveränderung der in Betracht kommenden Gebilde zuwenden. So sehen wir denn gleich, daß der Scheitel des Rostellums nicht mehr in, sondern 0,241 mm. über der Ebene der Saugnäpfe steht und durch eine linsenförmig vorspringende glatte Oberfläche ausgezeichnet ist. Die Krallenspitzen der Haken sind nicht mehr in der Ringfalte versteckt, sondern überragen, tief nach unten sehend, frei die Peripherie des Köpfchens; dem entsprechend halten auch die Wurzelfortsätze eine der früheren entgegengesetzte Position ein. Indem sie sich nämlich hart den Conturen des darunterliegenden Kiffens anschmiegen, steht der vordere vertical nach unten, der hintere horizontal. Schon ein flüchtiger Blick auf die Abbildung Fig. 3. belehrt uns darüber, daß diese Hakenstellung durch die Gestaltveränderung des darunterliegenden Kiffens bedingt ist. Letzteres gleicht hier einer planconvexen Linse, die ihre convexe Oberfläche nach außen gekehrt hat und zeigt auch in sofern noch eine Abweichung von dem früheren Verhalten, als hier die Fasern des ersten Systems nicht allein in der Mitte, sondern auch zu den Seiten hin einen verticalen Verlauf einhalten. Die Fasern des zweiten Systems und die auf ihren Querschnitten sich

präsentirenden Muskelbündel, so wie endlich die Vertheilung der Kerne in den einzelnen Faferystemen des Kiffens zeigen dieselben Verhältnisse, wie früher. Uebereinstimmend mit der Gestaltveränderung sind auch die Maafse des Kiffens etwas anders geworden; seine Höhe beträgt 0,076 mm., seine Breite 0,177 mm., seine Höhe einschliesslich der Cuticula 0,088 mm.

Auch im Verhalten der Muskelschalen haben wir eine Veränderung zu notiren, welche darin besteht, dafs ihre vorhin concavconvexe Gestalt ausgeglichen ist, ja sie noch mit einer, freilich unbedeutenden Wölbung gegen das Kiffen sich vorbuchten. Im Weiteren aber sind sie auch hier durch eine Körnerschicht von einander getrennt und gehen ohne eine scharfe Grenze in's Parenchym des Körpers über.

Wenn nun schon der Vergleich der macroscopischen Eigenthümlichkeiten unfres *Coenurus* mit denen des *Coenurus cerebralis* die Identität beider Formen bezweifeln läßt und wir in der verschiedenen Gestaltung der Haken in der That denn auch die Beweise zur Unterscheidung beider Arten verzeichnen konnten, so fragt es sich nun bei der Betrachtung des histologischen Baues des Rostellums des *Coenurus* vom Hasen, ob auch hierin nicht ein Unterschied zwischen den beiden Parasiten besteht. Rückfichtlich des Baues des Rostellums, müssen wir freilich die Frage verneinen; dagegen stellen sich in den Maassen der Rostella beider Parasiten gewisse Differenzen heraus, welche darin bestehen, dafs das Rostellum des *Coenurus* beim Hasen das des *Coenurus cerebralis* an Gröfse um ein Gewisses übertrifft. Wiewohl nun die Maafse des Rostellums je nach dem Zustande, in welchem dasselbe verharret, mehr oder minder variabel und nicht von so grofser Bedeutung sind, wie die Gröfsenverhältnisse der Haken, so glaube ich doch, dafs sie bis zu

einem gewissen Grade bei der Bestimmung der Species mit-helfen können. Als Beleg dafür stelle ich im Nachfolgenden die Maafse des Rostellums von *Coenurus cerebialis* mit denen des *Cysticercus crassicolis*, *tenuicollis* und unsres *Coenurus* zusammen:

	Höhe ohne Cutic.	Höhe mit Cutic.	Breite.
Coenur. cerebral. Rost. vorgest.	0,050—057	0,063	0,158
Coen. vom Hafen Rost. vorgest.	0,076	0,088	0,177
Cyst. tenuicoll. Rost. vorgest.	0,095	0,0126	0,228
Cyst crassicol. Rost. vorgest.	0,260	0,302	0,584

Wenn ich anschliessend hieran auch noch auf die mikroskopischen Verhältnisse der Blasenwand eingehe, so geschieht es weniger deshalb, als ob ich in der Lage wäre, darüber etwas besonders Bemerkenswerthes mit-zutheilen, als viel mehr, um dem Leser selbst die Möglichkeit an die Hand zu geben, mit Hülfe dieser Zeilen und der Abbildung Fig. 8 den Vergleich anzustellen, in wie weit die Strukturverhältnisse dieser Blasenwand mit denen der anderen der schon bekannten Blasenwürmer übereinstimmen.

Die Blasenwand unseres *Coenurus* misst 0,139 mm. im Dickendurchmesser und hat eine glatte innere und eine mit ansehnlichen Papillen besetzte äussere Fläche. Man unterscheidet an ihr eine Cuticula, eine sogenannte Subcuticula, eine weit verbreitete bindegewebige Grundsubstanz und darin eingelagerte Muskeln, Gefässe und Körner. Die Cuticula ist homogen, aber nicht glatt, sondern zeigt vielfach Rauigkeiten, die besonders an den Papillen deutlich wahrnehmbar sind. Diese Papillen aber, von welchen die meisten 0,025 hoch und ebenso dick sind, bestehen der Hauptmasse nach aus der subcuticularen Schicht; in ihrem basalen Theil zeigen sie ausserdem mehrere zusammengruppirte rundliche Gebilde,

welche theils als einfache Körner sich darstellen, theils als auf ihrem Querschnitte getroffene Muskelbündel an ihren hellen Conturen sich erkennen lassen. Aber nicht allein in den Papillen, sondern in der ganzen Dicke der Wand finden wir Muskelfasern und zwar sowohl solche, die ihrer Länge, als auch solche die ihrer Quere nach getroffen sind, wenn auch letztere vornehmlich in den Papillen sich vorfinden lassen. Im Allgemeinen aber haben die Muskeln in der Wandung keine gesetzmässige Anordnung, sondern, indem sie durch die ganze Dicke der Wandung zerstreut sind, durchkreuzen und verflechten sie sich, häufig grössere oder kleinere Maschenräume zwischen sich lassend, welche durch die mit grossen Kernen versehene Grundsubstanz ausgefüllt werden. Etwa in der Mitte der Wandung, mehr zur Subcuticula hin, ist dieses Maschenwerk am dichtesten zusammengedrängt und läßt von sich Muskelfasern ausgehen, welche in die Subcuticula hineinstrahlen. Gleich den Muskeln finden wir auch die Gefässe, von welchen wir sowohl Längs- als auch Querschnitte sehen, durch die ganze Dicke der Wandung zerstreut; namentlich ist aber die Nähe der inneren und äusseren Fläche der Wandung durch eine reichliche Einlagerung von Gefässen ausgezeichnet, während die Mitte sie in viel geringerer Zahl aufzuweisen hat. Die Innenfläche der Blase ist glatt und mit einem festen, fast homogen erscheinenden Gewebe ausgekleidet, welches durch eine Verdichtung der Fasern der Binde substanz entstanden gedacht werden kann.

Was nun das Wachstum des von uns beschriebenen Thieres angeht, so steht es von vornherein ausser allem Zweifel, daß es durch eine Proliferation nach innen, also dadurch stattfindet, daß die Mutterblase in erster Linie zahlreiche Köpfchen, ferner auch Tochterblasen und diese wiederum Enkelblasen nach innen absetzen, die ihrem Bau und

ihrer Natur nach sich nicht von der Mutterblase unterscheiden. So kann denn im Laufe der Zeit aus einem einfachen Coenurusstadium ein solches entstehen, welches daneben auch die Charaktere von Echinococcus besitzt, indem es Tochter- und Enkelblasen und in beiden gelegentlich Köpfchen entwickelt.

Was die Entstehung der Tochterblasen anlangt, so können letztere entweder selbstständig in der Wandung der Mutterblase sich entwickeln, oder dadurch, daß die Wand der Mutterblase sich ausbuchtet und diese Ausbuchtung sich zu einer neuen Blase abschnürt. Um dieser Frage auf den Grund zu kommen, wurden Schnitte aus einer Tochterblase angefertigt, die mit mehreren ihr breit und fest anhängenden, stecknadelkopfgroßen Enkelblasen versehen war. Es konnte vorausgesetzt werden, daß wenn eine Entwicklung durch Ausbuchtung und Abschnürung vorläge, solche an einer noch bestehenden Communication der einen oder der anderen Enkelblase mit der Tochterblase gesehen werden müsste. Es ist mir aber nicht gelungen, eine solche Communication aufzufinden und ich bin dadurch, was ich an den Präparaten gesehen habe, vielmehr zu der Ueberzeugung gelangt, daß die Blasen den wandständigen Entwicklungsmodus beobachten. Man nimmt nämlich erstens in der Dicke der Wandung eine Anhäufung von körniger Substanz wahr, welche die Blasenwand an dieser Stelle auftreibt; diese Auftreibung läßt sich durch mehrere Schnitte verfolgen und verschwindet dann; ferner sieht man an gewissen Stellen solche Gebilde, die, aus körniger Masse bestehend, sich mit einer Art von Cuticula zu umgeben scheinen und eine Andeutung von einem Lumen in ihrem Innern tragen; endlich kommen innerhalb der Wandung schon vollständig ausgebildete Blasen mit deutlichem Lumen und gut entwickelter Cuticula zur

Beobachtung, wodurch die Lamellen der ursprünglichen Blase weit aus einander getrieben und nach aussen zu bruchfack-artig vorgebuchtet werden. Die grösste solcher Blasen, die noch von der Mutterblase festgehalten wurde, betrug im Längendurchmesser 0,508, im Breitendurchmesser 0,234. Auf Grund dieser Beobachtungen glaube ich nun zu dem Schlusse berechtigt zu sein, daß die Blasen, von kleinen Anfängen ausgehend, innerhalb der Wandung der Mutterblase sich entwickeln und, nachdem sie eine gewisse Grösse erreicht, als abgeschlossene Gebilde abgesetzt werden. Damit will ich aber noch nicht gesagt haben, daß hier die Entwicklung ausschliesslich nach diesem Schema stattfindet; es möge hier ausserdem auch noch die Blasenbildung durch Ausstülpung und Abschnürung vorkommen und es lag nur vielleicht in der Mangelhaftigkeit des mir zur Untersuchung vorliegenden Materials, daß solches nicht zu meiner Beobachtung gelangte.

Vergleich des vorliegenden *Coenurus* vom Hafen mit andern Blasenwürmern.

Nachdem wir uns nun sowohl über die macroscopischen, als auch microscopischen Eigenthümlichkeiten unfres Thieres orientirt haben, können wir an die Frage herantreten, in wie weit es mit den aus der Litteratur citirten Fällen ähnlich ist. Dafs es mit dem *Coenurus cerebralis* nicht identisch sein dürfte, haben wir schon vielfach Gelegenheit gehabt hervorzuheben. Bezüglich der übrigen hier in Betracht kommenden Fälle, liegen uns leider von manchen, wegen der Unmöglichkeit die diesbezüglichen Originalarbeiten zu verschaffen, nicht die zur Beurtheilung dieser Frage nothwendigen Details vor. So müssen wir denn dahingestellt sein lassen, in wie weit die von Rose, Leblond, Cobbold und Perroncito gefundenen Parasiten mit dem unfrigen eine Gemeinschaft haben und ziehen zur Vergleichung nur die heran, über die wir besser orientirt sind.

Es ist nun wohl kaum zu bezweifeln, dafs der von Baillet vielfach im Zellgewebe und in der Muskulatur von Hafen und Kaninchen gefundene Parasit, den er als *Coenurus serialis* beschreibt, mit dem unfrigen identisch ist. Darauf hin weisen das Aussehen Thieres, sein Bau, die Gröfse der Scoleces und die Zahl und die Gröfse der Haken (Conf. pag. 9).

Dagegen möchte ich den von Prof. Böttcher beschriebenen Blasenwurm als ein von dem unfrigen ver-

schiedenes Thier halten. Zu dieser Annahme veranlaßt mich das ganz andere macroscopische Aussehen des Böttcher'schen *Cysticercus botryoides*, dann die Form der Haken, die — wie Fig. 7 der Abbildungen zeigt — eine ganz andere ist, als bei unfrem *Coenurus* und schliesslich noch die Gröfsenverhältnisse der Haken. Conf. pag. 10 und 11.

Identisch mit dem von uns beschriebenen Parasiten ist auch meiner Ansicht nach der von Lindemann mitgetheilte Fall; wenigstens stimmen in den macroscopischen Eigenthümlichkeiten beide Exemplare vielfach überein. Die microscopische Beschreibung, die Lindemann von seinem Wurme giebt, ist höchst mangelhaft und gestattet keinen Schluss; seine Fütterungsversuche beruhen auf einem Irrthum. Zweifellos ist der Lindemann'sche *Coenurus* ein junges Stadium, wotür die geringe Gröfse der Blase, der Köpfchen und der angebliche Mangel von Haken spricht. — Von dem von Pagenstecher am Halfe eines *Laplatabiebers* gefundenen Exemplar ferner glaube ich nicht annehmen zu dürfen, dafs er mit unfrem *Coenurus* identisch wäre. Es ist erstens schon das Aussehen des Pagenstecher'schen Blasenwurms ein anderes; dann sitzen die *Scolec*es hier an der Aussenwand und schliesslich ist die Hakenform eine ganz andere. Der Zahnfortsatz der Haken ist hier nämlich plump und gerundet, während er bei unfrem ein schlankes und schwächtiges Aussehen darbietet; der Wurzelsatz der grofsen Haken ist bei dem Pagenstecher'schen Exemplar um ein Drittheil kürzer, als beim *Coenurus cerebralis*, bei unfrem dagegen eher länger.

Noch weniger kann ich für die Identität der Megnin'schen *Coenurus polytuberculatus* mit dem unsrigen einsehen. Auch hier ist ein andres Aussehen der Blase; eine andere Anordnung der *Scolec*es, welche trotz der ansehn-

lichen Gröfse der Mutterblase viel kleiner sind, als bei unfrem Coenurus, schliesslich auch noch eine Verschiedenheit an den Haken, die einmal viel kleiner sind, als bei dem Coenurus vom Hafen und ausserdem auch ganz andere Formverhältnisse darbieten. Letztere sind in der betreffenden Originalarbeit auf der Tafel VIII Fig. 4 in recht anschaulicher Weise illustriert.

Wenn wir nun zum Schlusse die im Laufe der Abhandlung beregten Eigenthümlichkeiten unfres Coenurus nochmals kurz zusammenfassen: seinen Sitz in der Muskulatur eines Nagethieres; seine Fähigkeit durch eine Proliferation nach innen wiederum neue Blasen neben Köpfchen hervorzubringen; die Anordnung der Scoleces in Längsreihen und nicht in Gruppen, wie bei dem Coenurus cerebralis, die Form und Gröfsenverhältnisse der Haken, wenn wir alles das — sage ich — nochmals kurz zusammenfassen, so können wir uns nicht der Ueberzeugung verschliesen, dass er eine von Coen. cerebr. abscheidbare Coenurusart repräsentirt.

Aus den herangezogenen Vergleichen geht ferner hervor, dass er mit den von Baillet beschriebenen Coenurus und aller Wahrscheinlichkeit nach auch mit dem Coen. Lowtzeni von Lindemann identisch ist. Zugleich aber deuten die bisherigen Erwägungen und die aus der Literatur angeführten Fälle dahin, dass auch die in den Nagethieren derselben Species vorgefundenen Blasenwürmer nicht alle identisch sind, da ihre microscopischen Charactere, wo solche aufgezeichnet sind, mit einander nicht übereinstimmen. Ob hier noch mehrere Arten aus einander zu halten, oder ob die Differenzen als blosse Varietäten derselben Species zu deuten sind, das zu

entscheiden muß den spätern Untersuchungen vorbehalten werden.

Bezüglich der Benennungen des von mir beschriebenen polycephalen *Cysticercus* aus dem Hafen muß der Name *Coenurus serialis* Gervais aufrecht erhalten werden, da ihm erstens die Priorität zukommt und er ferner eine Haupt-eigenthümlichkeit: die Anordnung der *Scolec*es in Längsreihen, zum Ausdruck bringt; als synonym ist *Coenurus Lowtzeni* Lindemann zu setzen.

Interessant ist es ferner, sich noch darüber zu orientiren, ob die zu diesem Blasenwurme zugehörige *Taenie* bekannt ist und in welchem Thiere sie zur Entwicklung kommt. Da nun der Träger der Finne bestimmt ist, gewissen anderen Thieren, wie z. B. dem Fuchse, dem Wolfe, dem Hunde als Nahrungsthier zu dienen, so bedarf es keiner langen Ueberlegung, um unter diesen den Wirth der *Taenie* zu vermuthen. Diese Vermuthung wird denn auch durch die Experimentaluntersuchungen von Baillet in Toulouse bestätigt.

Der genannte Autor stellte nämlich mit einem dem unsrigen vollkommen gleichen Blasenwurm, den er bei einem Kaninchen gefunden hatte, bei Hunden Verfütterungsversuche an und erzog eine *Taenie*, die der *Taenia coenurus* (von *Coenurus cerebralis*) in hohem Grade ähnlich war. — Trotzdem aber liess er es dahingestellt, ob es sich hier um Repräsentanten verschiedener Arten handle oder nicht. Jedoch glaube ich, daß das verschiedene Aussehen der Haken, welches Baillet sehr wenig berücksichtigt zu haben scheint, ferner die Proglottiden, welche nach Baillet bei der *Taenia serialis* 4—5 mm. breit und 6—12 mm. lang sind, während sie bei der *Taenia coenur. cerebralis* nach Leuckart (die Parasiten des Menschen 1881,

pag. 719) durchschnittlich 5—6 mm. in der Länge und 2,5 mm. in der Breite betragen und endlich die Größenverhältnisse der Rostella hinreichende Motive zur Unterscheidung beider hergeben.

Was schliesslich die Angaben Lindemanns betrifft, welcher aus seinem Coenurus bei Hunden die *Taenia cucumerina* erzogen haben will, so beruhen sie, wie schon Eingangs bemerkt, auf einem Irrthum, da nach den Untersuchungen von Leuckart und Melnikoff die Finne der genannten Taenie microscopisch klein ist und in dem Hundehaarling (*Trichodectes canis*) lebt.



Erklärung der Abbildungen.

- Fig. 1.** Der beschriebene Blasenwurm in natürlicher Grösse, nach einer Zeichnung, die ich der Freundlichkeit des Herrn Stud. med. Ferd. Schmidt verdanke.
- Fig. 2** Der Kopf des Parasiten bei 75-facher Vergrösserung. Die schwarzen Punkte unterhalb der Saugnäpfe sind Kalkkörperchen mit eingedrungener Luft.
- Fig. 3.** Längsschnitt durch den Kopf bei 120-facher Vergrösserung. Ht. Hakentasche; Lm. Längsmuskulatur.
- Fig. 4.** Der Hakenkranz bei 120-facher Vergrösserung von oben gesehen.
- Fig. 5 u. 6.** Vergleichende Zusammenstellung der Haken des Coenur. serial. vom Hasen (5) und des Coenur. cerebral. (6), 120 Mal vergrössert. Der mit Buchstaben versehene Haken dient zur Erläuterung der Maassbestimmungen (pag. 36)..
- Fig. 7.** Haken des Böttcher'schen Cysticercus botryoides.
- Fig. 8.** Schnitt durch die Blasenwand des Coenur. vom Hasen. P. Papillen, M. Muskelfasern, K. Körner, G. Gefässe.
-

Fig 1.




Fig. 3.




Fig 7.



Fig. 4.




Fig. 8.



Fig 2.




Fig 5.





Fig 6.



Thesen.

1. Die Contagiosität der chron. Tuberculose ist als bewiesen zu betrachten.
 2. Die Blasenwand des Coenurus ist nicht befähigt an allen ihren Theilen Scoleces zu produciren.
 3. Bei chronischen Darmkrankheiten, die mit Diarrhoe einhergehen, ist neben Opium Naphthalin das beste Mittel.
 4. Das Sublimat verdient als Desinfectionsmittel in der geburtshilflichen Praxis den Vorzug vor der Carbolsäure.
 5. Die chronischen Krankheiten sind, soweit sie nicht chirurgisch behandelt werden können, der Therapie wenig zugänglich.
 6. Die Athemprobe hat in der gerichtlichen Medicin nur einen beschränkten Werth.
 7. Eine methodisch ausgeführte maximale Tiefathmung ist bei chronischen Lungenkrankheiten von grosser Bedeutung.
-

